



# Surcharge en fer : Comprendre et suivre votre traitement par déférasirox comprimés pelliculés



Livret d'information Patient

Ce document est diffusé par les laboratoires commercialisant des médicaments à base de déférasirox, sous l'autorité de l'ANSM.  
Version 1 / Octobre 2021

# En quoi cette brochure d'information peut-elle vous être utile ?

---

Votre médecin vous a prescrit un traitement par déférasirox : Exjade® ou un médicament générique. Le nom du médicament délivré par votre pharmacien ou prescrit par votre médecin est alors celui de la substance active suivie du nom du laboratoire et du dosage.

Vous trouverez dans cette brochure des informations importantes concernant votre traitement : la manière de le prendre, son suivi, ses éventuels effets indésirables, et des informations sur la prise d'autres médicaments pendant votre traitement par déférasirox.

Déférasirox se présente sous la forme de comprimés pelliculés.

Il est important de prendre votre traitement selon les recommandations données par votre médecin.

*Pour plus d'informations, consultez la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>*

Comme pour tout autre traitement médical, n'hésitez pas à discuter de votre traitement avec votre médecin.

# Sommaire

---

• Qu'est-ce que le déférasirox et comment agit-il ? .....	4
• Pourquoi m'a-t-on prescrit du déférasirox ? .....	4
• Dans quels cas le déférasirox est-il utilisé ? .....	5
• Comment prendre du déférasirox ? .....	5
• Quels sont les effets indésirables éventuels ? .....	7
• A propos des autres médicaments .....	9
• Quelles sont les modalités de surveillance de mon traitement ? .....	10
• Mes fiches de suivi : .....	11
• Mes informations .....	12
• Mon traitement par déférasirox .....	13
• Mes suivis .....	14
- visite 1 : début du traitement par déférasirox .....	15
- visites 2 à 12 : mes suivis .....	16

# Qu'est-ce que le déférasirox et comment agit-il ?

---

Le déférasirox, qui contient une substance active appelée déférasirox, est un chélateur du fer (ou « agent chélateur ») qui est utilisé pour aider à éliminer le fer en excès dans le corps.

Après la prise de déférasirox, le médicament va « piéger » le fer en excès dans votre sang permettant ainsi son élimination (principalement dans les selles).

## Pourquoi m'a-t-on prescrit du déférasirox ?

---

De nombreuses maladies nécessitent des transfusions, par exemple :

- la bêta-thalassémie majeure,
- la drépanocytose,
- les syndromes myélodysplasiques, ou SMD,
- d'autres anémies.

Si vous avez l'une de ces maladies, vous avez peut-être reçu plusieurs transfusions de globules rouges. Ces transfusions permettent d'augmenter le nombre de globules rouges dans votre sang ce qui vous aide à vous sentir mieux. Chaque transfusion de globules rouges que vous recevez contient du fer.

Le fer est un composant essentiel des globules rouges et plus précisément de l'hémoglobine, dont le rôle est de véhiculer l'oxygène dans tout le corps.

Cependant, l'organisme n'est pas capable d'éliminer le surplus (excès) de fer de façon naturelle ce qui conduit peu à peu à ce qu'on appelle **la surcharge en fer**. Les quantités de fer apportées par les transfusions sont beaucoup plus importantes que celles éliminées par l'organisme. Ce fer en excès est stocké dans certains organes, essentiellement dans le cœur, le foie et le pancréas. Cette surcharge en fer peut générer des complications au niveau de ces organes. Il est important d'éliminer ce fer en excès afin de maintenir votre taux de fer à un niveau adéquat. Le déférasirox, chélateur du fer, permet d'éliminer le fer en excès.

# Dans quels cas le déférasirox est-il utilisé ?

---

Déférasirox est utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique due à des transfusions sanguines fréquentes chez des patients de 6 ans et plus ayant une bêta-thalassémie majeure.

Déférasirox est aussi utilisé pour traiter la surcharge en fer chronique lorsque le traitement par la déféroxamine est contre-indiqué ou inadapté chez des patients ayant une bêta-thalassémie majeure avec une surcharge en fer due à des transfusions sanguines peu fréquentes, chez des patients ayant d'autres types d'anémies et chez les enfants âgés de 2 à 5 ans.

Déférasirox est aussi utilisé lorsque le traitement par déféroxamine est contre-indiqué ou inadapté pour traiter les patients de 10 ans et plus ayant une surcharge en fer associée à leur syndrome thalassémique mais qui ne sont pas dépendants des transfusions.

## Comment prendre du déférasirox ?

---

### 1. Comment le déférasirox se présente-t-il ?

Le déférasirox se présente sous forme de comprimés pelliculés.

Il est possible que vous deviez prendre plus d'un comprimé par jour. Votre médecin vous indiquera le nombre de comprimés et le dosage des comprimés que vous devez prendre chaque jour.

### 2. Quelle est la dose qui me convient ?

La dose de déférasirox est déterminée en tenant compte de votre poids corporel, de votre niveau actuel de surcharge en fer, du rythme de vos transfusions et de votre fonction rénale et hépatique.

Si vous recevez du déférasirox après avoir été traité par des perfusions de déféroxamine, votre médecin pourra également tenir compte de votre dose de déféroxamine lors du calcul de la dose de déférasirox.

### 3. Quand et comment prendre déférasirox ?

Vous devez prendre déférasirox une fois par jour, tous les jours, de préférence au même moment de la journée. Prendre déférasirox au même moment de la journée vous aidera aussi à vous rappeler quand vous devez prendre votre traitement.

Prendre déférasirox comprimés pelliculés **soit à jeun, soit avec un repas léger.**

Option 1 : Les comprimés pelliculés de déférasirox doivent être avalés entiers à l'aide d'un peu d'eau.

Option 2 : Pour les patients qui ne peuvent pas avaler les comprimés entiers, il est possible de les écraser puis de les mélanger à de la nourriture non solide (par exemple yaourt ou compote de pomme). La nourriture doit être mangée immédiatement et complètement. Ne pas conserver pour une utilisation ultérieure. Voir ci-après des méthodes d'écrasement des comprimés (vous pouvez demander conseil à votre pharmacien).

#### Méthodes de broyage pour les patients qui n'arrivent pas à avaler des comprimés entiers

Méthode 1 : A l'aide d'un dispositif de broyage	Méthode 2 : A l'aide d'une feuille de papier ciré (par exemple papier sulfurisé lisse)	Méthode 3 : A l'aide de deux cuillères
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Ouvrez le dispositif de broyage</li><li>2 Vérifiez que le dispositif de broyage est complètement sec</li><li>3 Placez le comprimé à l'intérieur du dispositif de broyage</li><li>4 Fermez et vissez complètement le dispositif de broyage dans le sens des aiguilles d'une montre</li><li>5 Versez l'intégralité de la poudre présente dans le dispositif de broyage dans un récipient adéquat</li><li>6 Optionnel : vous pouvez utiliser une brosse pour recueillir le restant de poudre présent dans le dispositif de broyage</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pliez une feuille de papier ciré en quatre</li><li>2 Dépliez la feuille de papier ciré et mettez-la à plat. Placez ensuite le comprimé au centre de la feuille de papier ciré</li><li>3 A nouveau, pliez la feuille de papier ciré en quatre</li><li>4 Utilisez un rouleau rigide (par exemple rouleau à pâtisserie) pour écraser le comprimé</li><li>5 Dépliez la feuille de papier ciré et utilisez la rainure de la feuille pour verser l'intégralité de la poudre dans un récipient adéquat</li><li>6 Optionnel : vous pouvez utiliser une brosse pour recueillir le restant de poudre présent sur la feuille de papier ciré</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Vérifiez que les deux cuillères sont complètement sèches</li><li>2 Placez le comprimé dans une des deux cuillères</li><li>3 Ajoutez une goutte d'eau dans la cuillère contenant le comprimé</li><li>4 Appuyez fermement le dos de la deuxième cuillère contre le comprimé présent dans la première cuillère pour écraser le comprimé</li><li>5 Versez l'intégralité de la poudre présente dans la cuillère dans un récipient adéquat</li><li>6 Optionnel : vous pouvez utiliser une brosse pour recueillir le restant de poudre présent sur la cuillère</li></ol>

**En cas de doute, suivez les instructions du fabricant**

#### 4. Que faire en cas d'oubli d'un comprimé pelliculé de déférasirox ?

Si vous avez oublié de prendre votre dose de déférasirox, prenez immédiatement le/les comprimé(s) oublié(s) même si l'oubli est constaté plus tard dans la journée. Le lendemain, poursuivez le traitement normalement en prenant votre traitement à l'heure habituelle.

Ne prenez pas une double dose de comprimés le jour suivant, afin de compenser le comprimé oublié.

#### 5. Que faire si vous avez pris plus de déférasirox que vous n'auriez dû ?

Si vous avez pris plus de déférasirox que vous n'auriez dû ou si quelqu'un d'autre a pris accidentellement votre traitement informez-en immédiatement votre médecin ou les services d'urgences de l'hôpital. Montrez à votre médecin la boîte de déférasirox. Un traitement médical d'urgence peut être nécessaire.

Il est possible que vous ressentiez des effets tels que des douleurs abdominales, des diarrhées, des nausées et vomissements ainsi que des troubles rénaux ou hépatiques qui peuvent être graves.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

---

Comme tous les médicaments, le déférasirox peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La plupart des effets indésirables sont légers à modérés et disparaîtront, généralement au bout de quelques jours à quelques semaines de traitement.

Les effets indésirables fréquents sont les nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, ballonnements, constipation, indigestion, éruption cutanée (apparition de boutons ou de plaques rouges), maux de tête et démangeaisons.

Vous pouvez également avoir des modifications de votre fonction rénale ou hépatique qui seront détectées lors de vos examens biologiques.

Un contrôle de vos fonctions rénale et hépatique devra être réalisé avant de commencer votre traitement par déférasirox et un suivi régulier devra être réalisé au cours de votre traitement (voir tableau de la page 10).

#### **Certains effets indésirables peuvent être sérieux et peuvent nécessiter l'intervention immédiate d'un médecin.**

*Ces effets indésirables sont peu fréquents (peuvent concerner jusqu'à 1 patient sur 100) ou rares (peuvent concerner jusqu'à 1 patient sur 1000). Arrêtez de prendre ce médicament et informez-en immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des effets suivants :*

- Si vous avez une éruption cutanée sévère, ou des difficultés respiratoires, des vertiges ou un gonflement du visage et de la gorge (signes de réactions sévères d'allergie).
- Si vous présentez plusieurs de ces symptômes : une éruption cutanée, une rougeur de la peau, des cloques au niveau des lèvres, des yeux ou de la bouche, la peau qui pèle, de la fièvre élevée, un syndrome pseudo-grippal, une augmentation de la taille de vos ganglions (signes d'une réaction cutanée sévère).

- Si vous remarquez une diminution importante du volume de vos urines (signe de problèmes rénaux).
- Si vous ressentez les signes suivants associés : somnolence, douleur abdominale supérieure droite, jaunissement ou augmentation du jaunissement de la peau ou des yeux et urines foncées (signes de problèmes hépatiques),
- Si vous avez des difficultés à réfléchir, à vous souvenir de différentes informations, ou à résoudre des problèmes, êtes moins vigilant ou attentif ou vous sentez très endormi avec peu d'énergie (signes d'un taux élevé d'ammoniaque dans votre sang, pouvant être associé à des problèmes hépatiques ou rénaux),
- Si vous vomissez du sang et/ou avez des selles noires,
- Si vous ressentez des douleurs abdominales fréquentes, particulièrement après avoir mangé ou pris du déférasirox,
- Si vous ressentez fréquemment des brûlures d'estomac,
- Si vous constatez une baisse partielle de votre vue,
- Si vous ressentez une douleur intense dans le haut de l'estomac (pancréatite).

### **Certains effets indésirables peuvent devenir sérieux.**

*Ces effets indésirables sont peu fréquents.*

- Si votre vue devient floue ou trouble,
- Si votre audition se réduit,

**dîtes-le à votre médecin dès que possible.**

**Souvenez-vous : Informez toujours votre médecin au sujet des effets indésirables que vous ressentez. Si vous avez un effet indésirable sérieux (voir liste ci-dessus), ARRETEZ de prendre ce médicament et contactez immédiatement votre médecin.**

**En l'absence d'effet indésirable sérieux, poursuivez votre traitement par déférasirox tous les jours aussi longtemps que votre médecin vous le dira.**

C'est un traitement à long terme, qui peut durer plusieurs mois ou années. Si vous avez des questions sur la durée de votre traitement par déférasirox, parlez-en à votre médecin.

Pour plus de détails sur les effets indésirables et les effets indésirables graves, référez-vous à la notice présente à l'intérieur de chaque boîte de médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr> Il est important de la lire avant de prendre du déférasirox.

Si vous ressentez **un quelconque effet indésirable**, parlez-en à votre médecin, pharmacien, ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.



## A propos des autres médicaments

---

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Ceci inclut les médicaments que vous prenez sans ordonnance. Votre médecin pourrait être amené à demander des tests supplémentaires pour suivre les taux sanguins de ces médicaments.

### **Vous devez informer votre médecin notamment si vous prenez les médicaments suivants :**

- les autres chélateurs du fer, qui ne doivent pas être pris avec le déférasirox,
- les antiacides (médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac) contenant de l'aluminium, qui ne doivent pas être pris en même temps que le déférasirox,
- la ciclosporine (utilisée pour prévenir les rejets de greffe ou dans d'autres indications telles que la polyarthrite rhumatoïde ou la dermatite atopique),
- la simvastatine (utilisée pour diminuer le cholestérol),
- certains médicaments contre la douleur ou les anti-inflammatoires (par exemple aspirine, ibuprofène, corticoïdes),
- les bisphosphonates oraux (utilisés pour traiter l'ostéoporose),
- les médicaments anti-coagulants (utilisés pour prévenir ou traiter les caillots sanguins),
- les médicaments contraceptifs (pilule contraceptive) [voir paragraphe « *contraception* » *ci-après*],
- le bépridil, l'ergotamine (utilisés pour les problèmes cardiaques et les migraines),
- le répaglinide (utilisé dans le traitement du diabète),
- la rifampicine (utilisée dans le traitement de la tuberculose),
- la phénytoïne, le phénobarbital, la carbamazépine (utilisés pour le traitement de l'épilepsie),
- le ritonavir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH),
- le paclitaxel (utilisé dans le traitement du cancer),
- la théophylline (utilisée pour traiter des maladies respiratoires comme l'asthme),
- la clozapine (utilisée pour traiter des troubles psychiatriques comme la schizophrénie),
- la tizanidine (utilisée comme relaxant musculaire),
- la cholestyramine (utilisée pour diminuer le taux de cholestérol dans le sang),
- le midazolam (utilisé comme sédatif, et dans le traitement de l'anxiété et de l'amnésie),
- le busulfan (utilisé en traitement avant une transplantation afin de détruire la moelle osseuse d'origine avant la transplantation).

### **Contraception :**

Si vous utilisez actuellement une contraception orale ou un patch contraceptif pour éviter une grossesse, vous devez utiliser une méthode contraceptive supplémentaire ou différente (par exemple un préservatif), car le déférasirox peut réduire l'efficacité du contraceptif oral ou du patch contraceptif.

# Quelles sont les modalités de surveillance de mon traitement ?

Lorsque vous prenez déférasirox, des tests sanguins et des tests urinaires sont réalisés régulièrement.

Cette surveillance permet d'évaluer votre réponse au traitement afin d'aider votre médecin à ajuster la dose de déférasirox si nécessaire. La dose de déférasirox est susceptible d'être augmentée ou diminuée au cours du traitement.

Examen	Avant de commencer le traitement déférasirox	Chaque mois	Une fois par an
<b>Fer</b> Ferritinémie	✓	✓	
<b>Reins</b> Créatininémie	✓ Vous aurez cet examen sanguin <b>à deux reprises</b> avant de commencer le traitement par déférasirox	✓ Vous aurez cet examen une fois par semaine durant le premier mois de traitement et au cours du premier mois qui suit une modification de dose du traitement ; puis chaque mois par la suite.	
<b>Clairance de la créatinine</b>	✓	✓ Vous aurez cet examen une fois par semaine durant le premier mois de traitement et au cours du premier mois qui suit une modification de dose du traitement ; puis chaque mois par la suite.	
<b>Foie</b> (transaminases sériques, bilirubinémie, phosphatases alcalines)	✓	✓ Durant le premier mois, vous aurez cet examen une fois toutes les 2 semaines, puis une fois chaque mois.	
<b>Urine</b> (recherche de protéines dans les urines)	✓	✓	
<b>Audition et/ou vue</b>	✓		✓
<b>Poids et taille</b>	✓		✓
<b>Chez l'enfant :</b> Croissance (poids, croissance, développement sexuel)	✓		✓

Votre médecin pourrait également :

- demander de réaliser un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM), afin de contrôler la surcharge en fer dans votre cœur et votre foie,
- demander de réaliser une biopsie de vos reins (prélèvement d'un échantillon de tissu rénal) s'il suspecte des dommages importants aux reins.

**Il est important de présenter ce carnet à votre médecin prescripteur de déférasirox à chaque visite pour y reporter dans les fiches de suivi situées en pages 15 à 26, l'ensemble de vos résultats ainsi que les éventuelles modifications de la dose de déférasirox.**

## Mes fiches de suivi

---

Vous et votre médecin prescripteur de déférasirox devez compléter les pages suivantes à chaque visite.

Cette surveillance permettra de suivre l'évolution de votre traitement au cours du temps.

Si les fiches de suivi de votre carnet sont entièrement complétées (ou en cas de perte de votre carnet), vous pouvez recevoir un nouvel exemplaire en vous adressant à votre médecin.

# Mes informations :

Ces informations vous seront utiles ainsi qu'à votre médecin lors de votre traitement par déférasirox. Demandez à votre médecin si vous avez besoin d'aide pour répondre à certaines questions.

Informations générales :

## Patient

NOM : .....

Prénom : .....

Date de naissance : .....

Ma maladie : .....

## Médecin prescripteur

NOM : .....

Prénom : .....

Spécialité : .....

Etablissement : .....

Adresse : .....

.....

Code postal : .....

Ville : .....

Tél : .....

Fax : .....

Email : .....

- Ai-je déjà reçu des transfusions de globules rouges ? Si oui, combien et à quelle fréquence ?

.....  
.....

- Ai-je d'autres problèmes de santé ?

.....  
.....

- Est-ce que je prends d'autres médicaments actuellement pour d'autres problèmes de santé ?

.....  
.....

- Ai-je des allergies ? Si oui, lesquelles ?

.....  
.....

# Mon traitement par déférasirox :

---

## L'objectif de mon traitement :

L'objectif de votre traitement par déférasirox est d'avoir une quantité normale de fer dans votre organisme. Chaque mois, votre médecin évaluera si vous vous rapprochez de cet objectif.

L'objectif du traitement sera fixé par votre médecin en fonction de votre taux de ferritine dans le sang (ferritinémie). Ce taux renseignera le médecin sur la quantité de fer présente dans votre corps, qui décidera alors s'il convient de faire baisser la ferritinémie, ou de la maintenir au même niveau.

Vous pouvez indiquer votre ferritinémie sur ce carnet à chaque visite chez le médecin.

## Ma dose de déférasirox

A chaque visite chez le médecin, indiquez sur votre carnet quelle dose de déférasirox vous a été prescrite. Votre médecin peut en effet décider de modifier votre dose en fonction de votre ferritinémie, d'autres résultats d'examens de laboratoires, ou de la fréquence à laquelle vous recevez une transfusion.

Après 3 à 6 mois de traitement, vérifiez avec votre médecin les progrès réalisés par rapport à l'objectif fixé en début de traitement. Si celui-ci n'est pas atteint, vous pourrez alors discuter avec votre médecin des mesures à prendre pour vous en rapprocher.

## Entre chaque visite

Des événements liés à votre traitement peuvent se produire durant la période qui sépare deux visites chez votre médecin. Vous devez les écrire sur votre carnet pour vous rappeler d'en discuter avec votre médecin lors de la prochaine visite.

Par exemple, il peut s'agir :

- de résultats d'analyses importants ou inhabituels,
- de nouvelles transfusions,
- d'effets indésirables,
- de la prise d'autres médicaments,
- du non-respect de la posologie prescrite par le médecin.

Nous vous rappelons qu'en cas de survenue d'effets indésirables sérieux, tels que mentionnés en pages 7 et 8 du livret, vous devez en informer votre médecin immédiatement.

# Mes suivis

---

# VISITE 1 : Début du traitement par déférasirox

Vous pourrez commencer à suivre vos résultats une fois que votre médecin aura déterminé la valeur cible de votre ferritinémie et votre dose de déférasirox. Avec l'aide de votre médecin, complétez vos objectifs de traitement et les autres informations ci-dessous.

**Date de la visite :** .....

**Dernière ferritinémie mesurée** Date : ..... Valeur : .....

**L'objectif de mon traitement** est de réduire ma ferritinémie à : .....

**Mon poids :** .....

## Mon traitement par déférasirox :

Quelle dose de déférasirox dois-je prendre quotidiennement ? .....

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

## VISITE 2 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\*Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

**Mon traitement par déférasirox :**

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....



## VISITE 3 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\* Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

Mon traitement par déférasirox :

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

## VISITE 4 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\*Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

**Mon traitement par déférasirox :**

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

## VISITE 5 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\* Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

Mon traitement par déférasirox :

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

## VISITE 6 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\*Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

Mon traitement par déférasirox :

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

# VISITE 7 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\* Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

Mon traitement par déférasirox :

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

## VISITE 8 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\*Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

**Mon traitement par déférasirox :**

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

# VISITE 9 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\* Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

Mon traitement par déférasirox :

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

## VISITE 10 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\*Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

**Mon traitement par déférasirox :**

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....



# VISITE 11 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\* Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

Mon traitement par déférasirox :

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

## VISITE 12 : Mon suivi

Date de la visite : .....

Dernière ferritinémie mesurée Date : ..... Valeur : .....

Commentaires de mon médecin concernant mon suivi ? :  
.....

Nombre de poches de globules rouges reçues depuis ma dernière visite : .....

Mon poids : .....

Est-ce que nous maintenons la posologie actuelle ?  Oui  Non\*

\*Si Non, indiquez : quelle est ma nouvelle dose ? .....

**Mon traitement par déférasirox :**

Je prends du déférasirox sous forme de **comprimés pelliculés**

Nombre de comprimés à prendre chaque jour :

	90 mg	180 mg	360 mg
Nombre de comprimés pelliculés	.....	.....	.....

A quelle heure prendre mes comprimés chaque jour ? .....

Comment prendre mes comprimés :

- Je peux avaler les comprimés entiers avec un peu d'eau.
- J'écraserai les comprimés et je saupoudrerai la dose totale dans une petite quantité de nourriture non solide (ex yaourt/compote) que je mangerai immédiatement et en totalité.

**Notes :** indiquez les questions que vous souhaitez poser lors de votre prochaine visite

.....  
.....  
.....

# Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

