

**Je suis sous traitement anticoagulant
par Rivaroxaban Viatris (rivaroxaban).**

Nom : _____

Adresse : _____

Date de naissance : _____

Poids : _____

Autres médicaments/Pathologies : _____

Carte de Surveillance du Patient

Viatris Limited

Rivaroxaban Viatris **2,5 mg**
comprimés pelliculés

Rivaroxaban Viatris **10 mg**
comprimés pelliculés

Rivaroxaban Viatris **15 mg**
comprimés pelliculés

Rivaroxaban Viatris **20 mg**
comprimés pelliculés

◆ **Gardez toujours cette carte sur vous.**

◆ **Montrez cette carte à tout médecin
ou dentiste que vous consultez avant
de commencer un traitement.**

En cas d'urgence, veuillez prévenir :

Nom du médecin : _____

Téléphone du médecin : _____

Cachet du médecin : _____

Veillez aussi prévenir :

Nom : _____

Téléphone : _____

Lien avec le patient : _____

Information à destination des professionnels de santé :

- ◆ Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de Rivaroxaban Viatris.

Que faut-il savoir sur Rivaroxaban Viatris ?

- ◆ Rivaroxaban Viatris fluidifie le sang, ce qui vous protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- ◆ Rivaroxaban Viatris doit être pris exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. **N'oubliez jamais de prendre votre traitement** afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- ◆ Vous ne devez jamais arrêter de prendre Rivaroxaban Viatris sans en parler d'abord à votre médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.
- ◆ Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, avant de prendre Rivaroxaban Viatris.

- ◆ Informez votre médecin que vous êtes traité par Rivaroxaban Viatris avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

Quand dois-je demander conseil à mon médecin ou à mon pharmacien ?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme Rivaroxaban Viatris, il est important de connaître les effets indésirables éventuels. Les saignements sont l'effet indésirable le plus fréquent. Si vous présentez un risque de saignement inhabituel, ne commencez pas à prendre Rivaroxaban Viatris sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin. Prévenez immédiatement votre professionnel de santé si vous présentez des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- ◆ douleurs
- ◆ gonflement ou sensations d'inconfort
- ◆ maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse
- ◆ ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper

- ◆ menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire
- ◆ sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires
- ◆ si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café

Comment dois-je prendre Rivaroxaban Viatris ?

- ◆ Pour garantir une protection optimale, Rivaroxaban Viatris
 - 2,5 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
 - 10 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
 - 15 mg doit être pris au cours des repas,
 - 20 mg doit être pris au cours des repas.