

IMPORTANT

CARTE DE MISE EN GARDE

COMPRIMÉS PELLICULÉS D'ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN (ABACAVIR/LAMIVUDINE)

CONSERVEZ CETTE CARTE SUR VOUS EN PERMANENCE

ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN contient de l'abacavir.

Certains patients prenant ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN peuvent donc développer une réaction d'hypersensibilité (réaction allergique grave) **qui peut menacer le pronostic vital** en cas de poursuite du traitement. **CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN qui vous indiquera si vous devez arrêter de prendre ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN :**

1) si vous présentez une éruption cutanée OU,

2) si vous présentez des symptômes appartenant à au moins DEUX des catégories suivantes :

- fièvre,
- essoufflement, maux de gorge ou toux,
- nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleurs abdominales,
- fatigue sévère ou courbatures ou sensation de malaise général.

Si vous avez arrêté le traitement par ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN en raison de cette réaction, **VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE** ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN, ni tout autre médicament contenant de l'abacavir (tel que Ziagen, Triumeq ou Trizivir) car cela peut entraîner, dans les heures qui suivent, une chute de votre pression artérielle menaçant le pronostic vital, voire le décès.

Contactez immédiatement votre médecin si vous suspectez une réaction d'hypersensibilité à **ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN.**

Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées de votre médecin :

Docteur :

Tél :

En cas d'absence de celui-ci, veuillez contacter immédiatement un autre médecin pour un avis médical (par exemple : service des urgences de l'hôpital le plus proche).

POUR TOUTE INFORMATION GÉNÉRALE CONCERNANT ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN, CONTACTEZ : MYLAN S.A.S. France **au 0800 12 35 50** (service et appel gratuit).